

Zeit für gute Vorsorge ...



Dr. med. Bodo Grahle

Facharzt Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH



DeflaGyn® Vaginalgel 3er Bundle

DeflaGyn® Vaginalgel ist ein Medizinprodukt auf der Basis von Siliziumdioxid zur Förderung der Remission bei unklaren Zervixabstrichen (PAP III oder PAP IIID).

Es enthält adsorbtive Bestandteile und

- * bindet Krankheitserreger
- * hemmt die Ausbreitung von Erregern
- * fördert den antioxidativen Schutz

Die Bedingungen für eine Spontanremission (Besserung des Befundes) werden dadurch gefördert. DeflaGyn® sollte für eine Dauer von 3 x 28 Tagen angewendet werden.

Wie wende ich DeflaGyn® an?

Bei der Anwendung von DeflaGyn® unterscheidet man zwischen nicht-menstruierenden und menstruierenden Patientinnen.

Nicht-Menstruierende Patientinnen: DeflaGyn® sollte für die Dauer von 3 x 28 Tagen angewendet werden. Nach 28 Tagen wird eine Therapiepause von 3 Tagen eingelegt. Danach wird die Therapie für weitere 28 Tage fortgesetzt.

Menstruierende Patientinnen: Während der Menstruationsblutung wird das DeflaGyn® Vaginalgel nicht angewendet (ca. 3 - 5 Tage/Zyklus). Eine zusätzliche Pause von 3 Tagen ist nicht erforderlich, da die Therapiepause bereits durch die Menstruationsblutung stattgefunden hat.